

intermak VITALIC MPG

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MONOPROPİLEN GLİKOL

ENERJİ - VİTAMİN - MİNERAL

Ne için kullanılır?



Vitalic MPG, ruminant hayvanlarda özellikle yüksek verimli süt ineklerinde metabolik hastalıklar olan ketozisten ve karaciğer yağlanmasından korunmaya yönelik olarak geliştirilmiştir.

Ne zaman kullanılır?



Ruminant Hayvanlarda doğum öncesi ve sonrasında kullanılan bir enerji içeceğidir.



DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI ENERJİ DESTEĞİ



Zayıf



Çok Yağlı / Kilolu

HEDEF

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Vücut Kondisyon Skoru: VKS


Faydaları:

- ◆ İçeriğindeki glikojenik etkili bileşikler (**Propilen Glikol, Gliserol ve propiyonik asit**) sayesinde hayvanların negatif enerji dengesine düşmesini engeller. Enerji metabolizmasını harekete geçirerek, hayvana extra enerji sağlar.
- ◆ Vitalic MPG bileşiminde bulunan **niasin**, organizmada enerji üretiminde rol alan bir çok mekanizmaya dahil olur ve aynı zamanda yağ asidi ve amino asit sentezinde rol oynayarak süt veriminde de etkilidir.
- ◆ **Niasin**; kanda NEFA ve BHBA düzeylerini düşürmesi ve glikoz oranını yükseltmesiyle antiketojenik etkilidir.
- ◆ Vitalic MPG'de propiyonat kullanımı kan glikoz seviyesini artırırken **BHBA (Beta Hidroksi Bütirat)** miktarını düşürmektedir.
- ◆ B grubu kompleks vitaminler sayesinde metabolizmayı düzenler.
- ◆ Kullanımı kolay, hızlı etkili bir üründür.

Enerji metabolizmasını harekete geçirir.

Negatif enerjiye düşmeyi engeller.

B grubu vitaminlerle metabolizmayı düzenler.



Kullanım Şekli:

Kullanım öncesi ürünü iyice çalkalayınız. Şişenin geniş kısmına kadar hayvanın ağızına yerleştirerek yutkunma refleksi ile birlikte içiriniz.

Uyarılar ve Önlemler:

- ◆ Sadece hayvan kullanımı içindir.
- ◆ **DİKKAT BU BİR İLAÇ DEĞİLDİR.** Yem katkı maddesidir. Tedavi amaçlı kullanılmaz.
- ◆ Yutkunma refleksi olmayan hayvanlara içirmeyiniz.

Uygulama Yöntemleri:

1. Geçiş dönemindeki veya negatif enerji dengesindeki ineklere ketozise karşı koruyucu olarak doğumdan önce 5 gün 500 ml, doğumdan sonra 5 gün 500 ml içirilir.
2. Şiddetli enerji yetmezliği vakalarında 12 saatte bir 500 ml içirilmesi önerilir.
3. Geçiş dönemindeki koyun ve keçilerde gebelik toksemisi ve ketozise karşı koruyucu olarak 1.5-2 ml/kg canlı ağırlık olarak ayarlanmalıdır.

Saklama Koşulları:

- ◆ Oda sıcaklığında saklayınız.
- ◆ Ürünü dondurmuyunuz.



Ambalaj:
500 ml ve 21 lt